

Efedrooni (metkatinoon) ja mangaani toime hürtel kroonilises katses : [TÜ arstiteaduskonna päeva 2009 stendiettekande teesid]

Asser, Andres; Kõks, Sulev; **Nairismägi, Jaak** Eesti Arst 2009 / 9, lk. 612-613 https://artiklid.elnet.ee/record=b1496051*est

Epileptogenesis in experimental models

Pitkänen, Asla; Khartishvili, Irina; **Karhunen, Heli**; Lukasiuk, Katarzyna; Immonen, Riikka; **Nairismägi, Jaak**; Gröhn, Olli; Nissinen, Jari Epilepsia 2007 / Suppl. 2, p. 13-20

Magnetic resonance imaging study of induced epileptogenesis in animal models of epilepsy

Nairismägi, Jaak 2006 https://www.esther.ee/record=b4369104*est

Manganese-enhanced magnetic resonance imaging of mossy fiber plasticity in vivo

Nairismägi, Jaak; Pitkänen, Asla; Narkilahti, Susanna; Kauppinen, Risto A.; Grohn, Olli H.J.; Huttunen, Johanna NeuroImage 2006 / 1, p. 130-135 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16246593/>

Status epilepticus in 12-day-old rats leads to temporal lobe neurodegeneration and volume reduction : a histologic and MRI study

Nairismägi, Jaak; Pitkänen, Asla; Kettunen, Mikko; Kauppinen, Risto; Kubova, Hana Epilepsia 2006 / 3, p. 479-488 : ill <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16529609/>